



Réserve Naturelle
ETANG DES LANDES



Rapport d'activités
Données scientifiques
2016



Conservatoire
d'espaces naturels
Limousin

MESURE DES DEBITS

Date	Chaussée (cm)	Ermite (cm)	Coursier (cm)	Débit Général (m ³ .s ⁻¹)
20/01/2016	151	71	2	0.1103515
29/01/2016	157	74.5	2	0.096974
05/02/2016	163	70.5	2	0.05908453
12/02/2016	178	86	2	0.63945745
18/02/2016	212	81	55	-0.3587909
25/02/2016	207	87	43	0.13497525
08/03/2016	210	82	40	-0.2484948
17/03/2016	203	71	20	-0.1567366
24/03/2016	199	61	9	-0.0120538
30/03/2016	200	68	13	-0.0076622
29/04/2016	195.5	71	20	-0.1462428
17/05/2016	192	65	17	-0.0661354
10/06/2016	198	79	29	-0.1611078
23/06/2016	191	67	25	-0.0169124

STOC EPS

Espèce	20/04/2016										21/05/2016									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Accenteur mouchet (<i>Prunella modularis</i>)							1													
Aigrette garzette (<i>Egretta garzetta</i>)				1	1	1	1													
Alouette lulu (<i>Lullula arborea</i>)				2																1
Bergeronnette grise (<i>Motacilla alba</i>)		1	1																	
Bergeronnette printanière (<i>Motacilla flava</i>)	1	11		2					11											
Bruant des roseaux (<i>Emberiza schoeniclus</i>)				1							1									
Bruant jaune (<i>Emberiza citrinella</i>)				1							1									
Busard des roseaux (<i>Circus aeruginosus</i>)																			1	
Buse variable (<i>Buteo buteo</i>)	1		1																	
Canard chipeau (<i>Anas strepera</i>)				1		1							1	2						
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	1	2	1	1						1										
Canard souchet (<i>Anas clypeata</i>)									8											
Chardonneret élégant (<i>Carduelis carduelis</i>)	1																		1	
Chevalier aboyeur (<i>Tringa nebularia</i>)			1																	
Chevalier guignette (<i>Actitis hypoleucos</i>)	1																			
Cigogne blanche (<i>Ciconia ciconia</i>)	2	1																		
Corneille noire (<i>Corvus corone</i>)	2	7	1	5	1	1	8			2	4									
Coucou gris (<i>Cuculus canorus</i>)						1								1	1	1	1	1	1	
Cygne tuberculé (<i>Cygnus olor</i>)		1		1															1	9
Étourneau sansonnet (<i>Sturnus vulgaris</i>)	5	1	2	1	1	1														
Faucon crécerelle (<i>Falco tinnunculus</i>)									1											
Fauvette à tête noire (<i>Sylvia atricapilla</i>)	2		3	2	3	2	4	1			3									
Fauvette des jardins (<i>Sylvia borin</i>)																		1		
Fauvette grisette (<i>Sylvia communis</i>)	1	1							2	1	1						1	1		
Foulque macroule (<i>Fulica atra</i>)		1	2	1	1	1	1	1			1									
Fuligule milouin (<i>Aythya ferina</i>)		6									2									
Geai des chênes (<i>Garrulus glandarius</i>)						3		1			1			2					2	
Gobemouche gris (<i>Muscicapa striata</i>)														2						
Grande Aigrette (<i>Ardea alba</i>)	50									2									3	
Grèbe castagneux (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)						1														
Grèbe huppé (<i>Podiceps cristatus</i>)		4																		
Grimpereau des jardins (<i>Certhia brachydactyla</i>)	1		1	1	1		1				1			3	1	1	1			1
Grive draine (<i>Turdus viscivorus</i>)					1		1													
Grive musicienne (<i>Turdus philomelos</i>)					1						1	1								1
Héron bihoreau (<i>Nycticorax nycticorax</i>)		1	1		1	1	1									1			1	
Héron cendré (<i>Ardea cinerea</i>)	1				1	2					1				1					
Héron garde-boeufs (<i>Bubulcus ibis</i>)			12														1		2	
Héron pourpré (<i>Ardea purpurea</i>)																				1
Hirondelle rustique (<i>Hirundo rustica</i>)	9		1	1																
Huppe fasciée (<i>Upupa epops</i>)	1																		1	2
Locustelle tachetée (<i>Locustella naevia</i>)								1												
Loriot d'Europe (<i>Oriolus oriolus</i>)					1	1					2									

Espèce	20/04/2016										21/05/2016									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Martinet noir (<i>Apus apus</i>)									1	10										
Merle noir (<i>Turdus merula</i>)	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1	1		1	2	2
Mésange à longue queue (<i>Aegithalos caudatus</i>)										1									1	
Mésange bleue (<i>Parus caeruleus</i>)	1		1	1	2	2	2	2		1	1	1	1		1		1		1	2
Mésange charbonnière (<i>Parus major</i>)	1							3		2	1		1							2
Milan noir (<i>Milvus migrans</i>)		2							1	1				1						1
Moineau domestique (<i>Passer domesticus</i>)	2	1										1	1							
Mouette rieuse (<i>Chroicocephalus ridibundus</i>)											1									
Phragmite des joncs (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)														2						
Pic épeiche (<i>Dendrocopos major</i>)									1											
Pic vert (<i>Picus viridis</i>)						1	1										1			1
Pie bavarde (<i>Pica pica</i>)			2																	
Pie-grièche écorcheur (<i>Lanius collurio</i>)																	2		1	
Pigeon biset urbain (<i>Columba livia f. urbana</i>)			1	1																
Pigeon ramier (<i>Columba palumbus</i>)					1		1							1			1	1	1	
Pinson des arbres (<i>Fringilla coelebs</i>)	1	2	1	1	1	2	2	2		3	2	2	2	1	4	2	1	2	1	2
Pipit des arbres (<i>Anthus trivialis</i>)							1	1	4	2							1	1	3	
Pouillot fitis (<i>Phylloscopus trochilus</i>)		1						1	1										1	
Pouillot véloce (<i>Phylloscopus collybita</i>)		1	1	2	3	1	1		1	2	1	1			1	1	1		1	2
Poule-d'eau (<i>Gallinula chloropus</i>)																		1		
Rossignol philomèle (<i>Luscinia megarhynchos</i>)	1	1		2		1		2	2	1	2			2			1	3	1	
Rougegorge familier (<i>Erithacus rubecula</i>)			1		1	2	3								2	2		1	1	1
Rougequeue à front blanc (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)							1													
Sittelle torchepot (<i>Sitta europaea</i>)			2				1		1				1							
Tarier pâtre (<i>Saxicola torquatus</i>)												1						1		
Tourterelle des bois (<i>Streptopelia turtur</i>)	1																1			
Tourterelle turque (<i>Streptopelia decaocto</i>)			2	1							1		2							
Troglodyte mignon (<i>Troglodytes troglodytes</i>)					2	1		1		1					2	1	1			

SUIVI DES HERONS NICHEURS

Espèce	Héron cendré (<i>Ardea cinerea</i>)	Héron pourpré (<i>Ardea purpurea</i>)	Bihoreau bris (<i>Nycticorax nycticorax</i>)	Aigrette garzette (<i>Egretta garzetta</i>)	Héron gardeboeuf (<i>Bubulcus ibis</i>)
Nombre de couples estimé	35-40	3-5	15-20	2-3	5-10

Espèce	13/01	02/02	17/02	01/03	15/03	30/03	15/04	03/05	20/05	03/06	16/06	30/06	04/08	18/08	15/09	17/10	15/11	05/12	14/12
Aigrette garzette (<i>Egretta garzetta</i>)		2				7	7	2	1	1	3	1		10	6	10	1		
Balbuzard pêcheur (<i>Pandion haliaetus</i>)														1					
Bécasseau maubèche (<i>Calidris canutus</i>)															1				
Bécasseau minute (<i>Calidris minuta</i>)															1				
Bécasseau variable (<i>Calidris alpina</i>)														5	10	6	11		
Bécassine des marais (<i>Gallinago gallinago</i>)							1						1	11	35	1			
Bruant des roseaux (<i>Emberiza schoeniclus</i>)	x				x	1	1		x										
Busard des roseaux (<i>Circus aeruginosus</i>)											1			1	1				
Canard chipeau (<i>Anas strepera</i>)	180	30	13	30	10	4	10	5	12	17	11	14	10	20	60	80	230	1	3
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	800	250	84	105	28	38	50	20	20	20	50	70	500	nc	800	900	940	580	509
Canard pilet (<i>Anas acuta</i>)	15												1			12	33	1	
Canard siffleur (<i>Anas penelope</i>)	120	40	21	30	80		4								2	29	2		1
Canard souchet (<i>Anas clypeata</i>)	260	100	100	75	84	30	30		1						30	130	420	1	
Chevalier aboyeur (<i>Tringa nebularia</i>)							2							1					
Chevalier arlequin (<i>Tringa erythropus</i>)														1					
Chevalier combattant (<i>Philomachus pugnax</i>)															3	2			
Chevalier culblanc (<i>Tringa ochropus</i>)						1								1				1	
Chevalier gambette (<i>Tringa totanus</i>)							x	2						1					
Chevalier guignette (<i>Actitis hypoleucos</i>)	2	1	1	1				4					2		1		1		
Chevalier sylvain (<i>Tringa glareola</i>)							1							8					
Courlis cendré (<i>Numenius arquata</i>)	2	2	1		4	2		1						1	1	5		1	17
Courlis corlieu (<i>Numenius phaeopus</i>)							1												
Cygne tuberculé (<i>Cygnus olor</i>)	37	34	7	10	30	7	7	8	30	7	7	23	56	46	55	3			
Échasse blanche (<i>Himantopus himantopus</i>)							1												
Faucon hobereau (<i>Falco subbuteo</i>)								5											
Foulque macroule (<i>Fulica atra</i>)	900	100	38	70	54	24	39	14	24	42	60	144	250	0	970	1030	30		
Fuligule milouin (<i>Aythya ferina</i>)	180	140	119	90	86	10	30	13	26	22	24	17	70	60	62	50	80		
Fuligule morillon (<i>Aythya fuligula</i>)	15	15	26	32	28			2	3		6	3	3			2	3		
Goéland cendré (<i>Larus canus</i>)																			2
Goéland leucophée (<i>Larus michahellis</i>)																	1		
Grand Cormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	70	40	15	6			1						1		10	165	40		
Grand Gravelot (<i>Charadrius hiaticula</i>)														1	2				
Grande Aigrette (<i>Ardea alba</i>)	13	13	10	4	4		40	5	1	1			4	17	12	95	139	1	20
Grèbe à cou noir (<i>Podiceps nigricollis</i>)			1	1		10	1	3	2	5	5	5				2			
Grèbe castagneux (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)				3	8	10	4		1		2	3	20	30	55	80	20		
Grèbe huppé (<i>Podiceps cristatus</i>)	10	20	5	15	30	20	24	17	22	20	30	25	40	30	50	35	10		

Espèce	13/01	02/02	17/02	01/03	15/03	30/03	15/04	03/05	20/05	03/06	16/06	30/06	04/08	18/08	15/09	17/10	15/11	05/12	14/12
Grue cendrée (<i>Grus grus</i>)				80			x										21		
Guifette moustac (<i>Chlidonias hybrida</i>)							2		3			1							
Guifette noire (<i>Chlidonias niger</i>)									2				1	6		1			
Harle piette (<i>Mergellus albellus</i>)	2	1	2	2	4														
Héron bihoreau (<i>Nycticorax nycticorax</i>)						1	30	4	10	11	9	5		1					
Héron cendré (<i>Ardea cinerea</i>)	10	20	20	30	50	40	76	24	28	34	27	7	10	10	10	8	49		12
Héron garde-boeufs (<i>Bubulcus ibis</i>)						17	16	21	5	16	21	17	7	2	31				
Héron pourpré (<i>Ardea purpurea</i>)							6	3	3	1	4	3							
Ibis falcinelle (<i>Plegadis falcinellus</i>)							1												
Martin-pêcheur d'Europe (<i>Alcedo atthis</i>)	1				4										1				
Mouette mélanocéphale (<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>)														1					
Mouette pygmée (<i>Hydrocoloeus minutus</i>)							11												
Mouette rieuse (<i>Chroicocephalus ridibundus</i>)	20	50	50	50	100	1	1	1			1	1	15	18	15	27	33	1	1
Nette rousse (<i>Netta rufina</i>)	1	1						1		1	1				2	1			
Phragmite des joncs (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)							x		1										
Pluvier argenté (<i>Pluvialis squatarola</i>)																1			
Poule-d'eau (<i>Gallinula chloropus</i>)						1	x	1	x	1		1	2	20	15				
Râle d'eau (<i>Rallus aquaticus</i>)						1	x		x					x	1				
Rémiz penduline (<i>Remiz pendulinus</i>)																1			
Rousserolle effarvate (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)									x					1					
Sarcelle d'été (<i>Anas querquedula</i>)										3	3								
Sarcelle d'hiver (<i>Anas crecca</i>)	560	30	22	80	60		20						6	100	194	280	1300	570	481
Spatule blanche (<i>Platalea leucorodia</i>)																2			
Sterne pierregarin (<i>Sterna hirundo</i>)							4		1	2									
Tadorne casarca (<i>Tadorna ferruginea</i>)														2					
Tadorne de Belon (<i>Tadorna tadorna</i>)	4					1											17		
Vanneau huppé (<i>Vanellus vanellus</i>)		11		20									1	24	23	25	160	1	

x : contact auditif

Nc : non compté

CAMP DE BAGUAGE (PROGRAMMES VOIE ET SEJOUR)

ESPECE	B	C	R	Total général
Accenteur mouchet (<i>Prunella modularis</i>)	5			5
Bergeronnette grise (<i>Motacilla alba</i>)	17			17
Bergeronnette printanière (<i>Motacilla flava</i>)	131	2	2	135
Bruant des roseaux (<i>Emberiza schoeniclus</i>)	144	1		145
Bruant jaune (<i>Emberiza citrinella</i>)	1			1
Etourneau sansonnet (<i>Sturnus vulgaris</i>)	6			6
Fauvette à tête noire (<i>Sylvia atricapilla</i>)	41	4		45
Fauvette des jardins (<i>Sylvia borin</i>)	48	3	1	52
Fauvette grisette (<i>Sylvia communis</i>)	19	5		24
Gobemouche noir (<i>Ficedula hypoleuca</i>)	3			3
Gorgebleue à miroir (<i>Luscinia svecica</i>)	19	2		21
Grimpereau des jardins (<i>Certhya brachydactyla</i>)	6			6
Grive musicienne (<i>Turdus philomelos</i>)	2			2
Hirondelle de rivage (<i>Riparia riparia</i>)	117	3		120
Hirondelle rustique (<i>Hirundo rustica</i>)	2736	28		2764
Hypolaïs polyglotte (<i>Hippolais polyglotta</i>)	8	1		9
Locustelle lusciniôide (<i>Locustella luscinioides</i>)	2	1		3
Locustelle tachetée (<i>Locustella naevia</i>)	11			11
Martin-pêcheur d'Europe (<i>Alcedo atthis</i>)	4			4
Merle noir (<i>Turdus merula</i>)	4			4
Mésange à longue queue (<i>Aegithalos caudatus</i>)	20	1		21
Mésange bleue (<i>Parus caeruleus</i>)	46	7		53
Mésange charbonnière (<i>Parus major</i>)	11	3		14
Mésange nonnette (<i>Poecile palustris</i>)	3	1		4
Phragmite aquatique (<i>Acrocephalus paludicola</i>)	1			1
Phragmite des joncs (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)	96	19		115
Pie-grièche écorcheur (<i>Lanius collurio</i>)	5		1	6
Pipit des arbres (<i>Anthus trivialis</i>)	2			2
Pipit farlouse (<i>Anthus pratensis</i>)	1			1
Pouillot fitis (<i>Phylloscopus trochilus</i>)	21	1		22
Pouillot véloce (<i>Phylloscopus collybita</i>)	51	3		54
Rémiz penduline (<i>Remiz pendulinus</i>)	48	11		59
Rossignol philomèle (<i>Luscinia megarhynchos</i>)	8			8
Rougegorge familier (<i>Erithacus rubecula</i>)	29	9		38
Rougequeue à front blanc (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	5			5
Rousserolle effarvate (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)	751	160	1	912
Rousserolle turdoïde (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>)	6	3		9
Rousserolle verderolle (<i>Acrocephalus palustris</i>)	1	1		2
Tarier des prés (<i>Saxicola rubetra</i>)	4			4
Tarier pâtre (<i>Saxicola torquata</i>)	15	5		20
Torcol fourmilier (<i>Jynx torquilla</i>)	8			8
Troglodyte mignon (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	3			3
Total général	4459	274	5	4738

OBSERVATIONS REMARQUABLES

Espèce	Date, période	Commentaires
Avocette élégante (<i>Recurvirostra avosetta</i>)	Mars	10 en halte le 27
Barge à queue noire (<i>Limosa limosa</i>)	Août, Octobre	En halte sur l'étang
Bécasseau cocorli (<i>Calidris ferruginea</i>)	Septembre	1 individu en halte
Bécasseau maubèche (<i>Calidris canutus</i>)	Septembre	Jusqu'à 2 individus en halte
Bécasseau minute (<i>Calidris minutus</i>)	Septembre	Quelques individus en halte
Bécasseau sanderling (<i>Calidris alba</i>)	Septembre	1 individu en halte
Bécassine sourde (<i>Lymnocyptes minimus</i>)	Novembre	2 individus vus en queue d'étang le 24
Cigogne blanche (<i>Ciconia ciconia</i>)	Printemps	Premier cas de reproduction pour le limousin non loin de la réserve.
Cisticole des joncs (<i>Cisticola juncidis</i>)	Septembre, décembre	1 individu vu
Courlis cendré (<i>Numenius arquata</i>)	Hiver 16-17	Hivernage d'un groupe de 15-20 individus
Courlis corlieu (<i>Numenius phaeopus</i>)	Avril	1 individu en halte quelques jours
Crabier chevelu (<i>Ardeola ralloides</i>)	Mai, juillet	Individus en halte
Cygne de Bewick (<i>Cygnus columbianus</i>)	Novembre	1 individu le 26
Echasse blanche (<i>Himantopus himantopus</i>)	Mars, avril	Jusqu'à 8 individus en halte
Garrot à œil d'or (<i>Bucephala clangula</i>)	Mars, mai	Un couple observé
Goéland cendré (<i>Larus canus</i>)	Décembre	Jusqu'à 4 individus
Goéland railleur (<i>Larus genei</i>)	18 août	1 individu vu
Grue cendrée (<i>Grus grus</i>)	Hiver	Hivernage d'un groupe d'une trentaine d'individus
Guifette leucoptère (<i>Chlidonias leucopterus</i>)	Mai	Jusqu'à trois individus vus en halte
Harle bièvre (<i>Mergus merganser</i>)	Janvier	1 individu stationne une partie de l'hiver
Harle huppé (<i>Mergus serrator</i>)	Décembre	1 individu le 27
Harle piette (<i>Mergellus albellus</i>)	Janvier à mars	2 individus hivernant
Huîtrier pie (<i>Haematopus ostralegus</i>)	Mars	1 individu en vol sur l'étang
Ibis falcinelle (<i>Plegadis falcinellus</i>)	Avril	1 individu présent du 2 au 18 avril
Marouette ponctuée (<i>Porzana porzana</i>)	Avril, octobre	Seules quelques observations en période de migration
Mouette mélanocéphale (<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>)	Juillet, août	En halte
Mouette pygmée (<i>Hydrocoloeus minutus</i>)	Avril, août, septembre	Des groupes de 11 et 16 individus vus en halte
Nette rousse (<i>Netta rufina</i>)	Janvier à juin, automne	Un couple présent en période de reproduction. Jusqu'à 11 individus en halte
Oie rieuse (<i>Anser albifrons</i>)	Novembre	Stationnement de 4 individus durant 20 jours
Pluvier argenté (<i>Pluvialis squatarola</i>)	Octobre	1 individu en halte
Rémiz penduline (<i>Remiz pendulinus</i>)	Avril, octobre	Plusieurs groupes vus lors des passages migratoires
Spatule blanche (<i>Platalea leucorodia</i>)	Octobre	2 individus en halte pendant 15 jours
Sterne pierregarin (<i>Sterna hirundo</i>)	Avril, mai, juin août	Jusqu'à 4 individus en halte
Tournepierre à collier (<i>Arenaria interpres</i>)	10 sept	1 individu en halte

SUIVI ODONATES (STELIF)

Transect	Espèce	09/06	10/06	22/06	30/06
S#1	<i>Anax imperator</i> Leach, 1815	X		X	
	<i>Chalcolestes viridis</i> (Vander Linden, 1825)			X	X
	<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	X		X	X
	<i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832)				X
	<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)	X		X	X
	<i>Erythromma najas</i> (Hansemann, 1823)				X
	<i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840)				X
	<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	X		X	X
	<i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823)	X		X	X
	<i>Lestes virens</i> (Charpentier, 1825)				X
	<i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758	X		X	
	<i>Orthetrum albistylum</i> (Selys, 1848)			X	
	<i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)			X	X
S#2	<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)		X	X	
	<i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842)				X
	<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)		X	X	X
	<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)		X	X	X
	<i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823)		X	X	X
	<i>Lestes virens</i> (Charpentier, 1825)				X
	<i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758		X	X	
	<i>Orthetrum albistylum</i> (Selys, 1848)		X		X
	<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)		X		
	<i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771)				X
	<i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 1820)		X		
<i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)		X	X	X	
S#3	<i>Anax imperator</i> Leach, 1815		X	X	
	<i>Brachytron pratense</i> (O.F. Müller, 1764)		X		
	<i>Chalcolestes viridis</i> (Vander Linden, 1825)				X
	<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)		X	X	
	<i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832)				X
	<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)			X	X
	<i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840)				X
	<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)		X	X	X
	<i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823)		X	X	X
	<i>Lestes virens</i> (Charpentier, 1825)			X	X
	<i>Leucorrhinia pectoralis</i> (Charpentier, 1825)		X		
	<i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758		X	X	
	<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)			X	
	<i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 1820)		X		
	<i>Sympetrum meridionale</i> (Selys, 1841)				X
	<i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)		X	X	X

SUIVI DES AMPHIBIENS (POPAMPHIBIENS)

	30/03/2016	31/03/2016	19/04/2016	20/04/2016
MCPE 1	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)			
MCPE 2	<i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)			
MCPE 3	<i>Pelophylax kl. esculentus</i> (Linnaeus, 1758)			
MLGC 1	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	3		
MLGC 2	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	1		
MLGC 3	<i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)	2		
MLGC 4	<i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	1		
MLGC 5	<i>Pelophylax kl. esculentus</i> (Linnaeus, 1758)	1		
MPGC 1	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	1		
MPGC 2	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	1		
MPGC 3	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	1		
MPIS 1	<i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	1		
MPIS 2	<i>Pelophylax kl. esculentus</i> (Linnaeus, 1758)	1		
MPIS 3	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	1		
MPIS 4	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	1		
MPIS 5	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	1		
MPLG 1	<i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	1		
MPLG 2	<i>Pelophylax kl. esculentus</i> (Linnaeus, 1758)	1		
MPME 1	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	1		
MPME 2	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	1		

SUIVI DES REPTILES (POPREPTILES)

Code transect	Date	Espèce	Sexe	Stade*	Heure début	Heure fin				Nébulosité*	Vent*								
							Pluie*	T°C air	T°C au sol			Début	Plaque A	Entre A à B	Plaque B	Entre B à C	Plaque C	Entre C à D	Plaque D
EtLa_3	19/04	RAS			15:55	16:15	Nulle	16	22	Belles éclaircies	2								
EtLa_2	19/04	Orvet fragile	?	Juv	16:15	16:30	Nulle	16	24	Belles éclaircies	2			1					
EtLa_1	19/04	Lézard vivipare	F	Ad	16:30	17:00	Nulle	16	25	Belles éclaircies	2			1					
EtLa_3	05/04	RAS			10:20	10:40	Nulle	13	17	Ensoleillé	1								
EtLa_2	05/04	Lézard vivipare	?	Juv	10:40	11:00	Nulle	13	22	Ensoleillé	1			1					
EtLa_1	05/04	Orvet fragile	?	Juv	11:00	11:20	Nulle	13	15	Ensoleillé	1					2			
EtLa_3	07/06	RAS			10:23	10:48	Nulle	20	22	Nuageux prédominant	1								
EtLa_2	07/06	RAS			10:48	11:10	Nulle	20	29	Nuageux prédominant	1								
EtLa_1	07/06	RAS			11:11	11:30	Nulle	20	24	Nuageux prédominant	1								
EtLa_3	17/05	Lézard vivipare	?		10:03	10:20	Nulle	14	17	Ensoleillé	0					1			
EtLa_2	17/05	Lézard vivipare	?		10:20	10:35	Nulle	14	17	Ensoleillé	0			1					
EtLa_2	17/05	Orvet fragile	?		10:20	10:35	Nulle	14	17	Ensoleillé	0				1				
EtLa_1	17/05	Orvet fragile	?		10:36	11:05	Nulle	14	15	Ensoleillé	0				1				1
EtLa_3	18/06	RAS			15:03	15:31	Nulle	20	23	Nuageux prédominant	1								
EtLa_2	18/06	Coronelle lisse	?	Juv	15:31	15:48	Nulle	20	23	Nuageux prédominant	1		1						
EtLa_2	18/06	Orvet fragile	?	Juv	15:31	15:48	Nulle	20	26	Nuageux prédominant	1				1				
EtLa_1	18/06	Couleuvre à collier	?	Ad	15:48	16:05	Nulle	20	28	Nuageux prédominant	1			1					
EtLa_1	18/06	Orvet fragile	?	Ad	15:48	16:05	Nulle	20	28	Nuageux prédominant	1				2				

COMPLEMENTS D'INVENTAIRES

FLORE

Taxon	Commentaire
<i>Acer campestre</i> L., 1753	
<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	
<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	
<i>Agrimonia procera</i> Wallr., 1840	
<i>Agrostis canina</i> L., 1753	
<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	
<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	
<i>Aira caryophyllea</i> L., 1753	
<i>Aira multiculmis</i> Dumort., 1824	Espèce maintenant. Avant considérée comme ssp de caryophyllea
<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	
<i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796	
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753	
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	
<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol., 1799	
<i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753	
<i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	
<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	
<i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski, 1934	
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814	
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842	
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753	
<i>Argentina anserina</i> (L.) Rydb., 1899	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	
<i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753	
<i>Arum maculatum</i> L., 1753	
<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer, 1838	
<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854	
<i>Ballota nigra</i> subsp. foetida (Vis.) Hayek, 1929	
<i>Barbarea intermedia</i> Boreau, 1840	
<i>Bellis perennis</i> L., 1753	
<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	
<i>Bidens cernua</i> L., 1753	
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	
<i>Briza media</i> L., 1753	
<i>Bromus hordeaceus</i> subsp. hordeaceus L., 1753	
<i>Bromus racemosus</i> L., 1762	
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792	
<i>Capsella bursa-pastoris</i> subsp. rubella (Reut.) Hobk., 1869	
<i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753	
<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	
<i>Carduus nutans</i> L., 1753	sortie abnl, sur le talus des berges du domaine de landes
<i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785	quelques individus sur la digue
<i>Carex elata</i> All., 1785	
<i>Carex elongata</i> L., 1753	
<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	
<i>Carex hirta</i> L., 1753	
<i>Carex montana</i> L., 1753	

Taxon	Commentaire
<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778	
<i>Carex otrubae</i> Podp., 1922	
<i>Carex pallescens</i> L., 1753	
<i>Carex panicea</i> L., 1753	
<i>Carex pilulifera</i> L., 1753	
<i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753	
<i>Carex pulicaris</i> L., 1753	
<i>Carex vesicaria</i> L., 1753	
<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	
<i>Centaurea decipiens</i> Thuill., 1799	
<i>Centaureum erythraea</i> Rafn, 1800	
<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982	
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799	
<i>Chelidonium majus</i> L., 1753	abord des bâtiments
<i>Circaea lutetiana</i> L., 1753	
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	
<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	
<i>Cirsium x forsteri</i> (Sm.) Loudon, 1832	1 pied dans l'enclos de la grande chaume
<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	
<i>Convolvulus sepium</i> L., 1753	
<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	
<i>Corylus avellana</i> L., 1753	
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852	
<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	
<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	
<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962	
<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805	
<i>Daucus carota</i> L., 1753	
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812	
<i>Dianthus armeria</i> L., 1753	
<i>Digitalis purpurea</i> L., 1753	
<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002	
<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	
<i>Draba verna</i> L., 1753	
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	
<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	
<i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818	
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	
<i>Eleocharis palustris</i> subsp. <i>waltersii</i> Bures & Danihelka, 2008	
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934	en face maison rnn
<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	
<i>Epilobium montanum</i> L., 1753	chemin qui borde la rnn en allant vers trois bouleaux
<i>Erica tetralix</i> L., 1753	
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789	
<i>Ervum tetraspermum</i> L., 1753	sur berges domaine de landes
<i>Eryngium campestre</i> L., 1753	
<i>Euonymus europaeus</i> L., 1753	
<i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel, 1886	
<i>Festuca nigrescens</i> Lam., 1788	prairie grande chaume
<i>Festuca rubra</i> L., 1753	
<i>Ficaria verna</i> Huds., 1762	

Taxon	Commentaire
<i>Filago germanica</i> L., 1763	
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	
<i>Fragaria vesca</i> L., 1753	
<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	
<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	
<i>Fumaria officinalis</i> L., 1753	
<i>Galium aparine</i> L., 1753	
<i>Galium mollugo</i> L., 1753	
<i>Galium palustre</i> L., 1753	
<i>Galium uliginosum</i> L., 1753	
<i>Galium verum</i> L., 1753	
<i>Genista anglica</i> L., 1753	
<i>Genista tinctoria</i> L., 1753	
<i>Geranium columbinum</i> L., 1753	
<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	
<i>Geranium molle</i> L., 1753	
<i>Geranium pusillum</i> L., 1759	vers domaine de landes
<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	
<i>Geum urbanum</i> L., 1753	
<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	
<i>Gratiola officinalis</i> L., 1753	retrouvée au genévrier. 200 à 300 tiges
<i>Hedera helix</i> L., 1753	
<i>Helosciadium inundatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	
<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753	
<i>Hieracium umbellatum</i> L., 1753	
<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	
<i>Holcus mollis</i> L., 1759	
<i>Hordeum murinum</i> L., 1753	
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753	
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	
<i>Hypericum elodes</i> L., 1759	
<i>Hypericum humifusum</i> L., 1753	
<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753	
<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	
<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	
<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	
<i>Isoetes velata</i> subsp. <i>tenuissima</i> (Boreau) O.Bolòs & Vigo, 1974	sont encore sous l'eau
<i>Isolepis fluitans</i> (L.) R.Br., 1810	
<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791	
<i>Jasione montana</i> L., 1753	
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	
<i>Juncus articulatus</i> L., 1753	berges domaine de landes
<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	
<i>Juncus bulbosus</i> L., 1753	
<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	
<i>Juncus effusus</i> L., 1753	
<i>Juncus inflexus</i> L., 1753	
<i>Juncus squarrosus</i> L., 1753	
<i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799	
<i>Juniperus communis</i> L., 1753	
<i>Lactuca serriola</i> L., 1756	
<i>Lamium purpureum</i> L., 1753	
<i>Lapsana communis</i> L., 1753	
<i>Lathyrus linifolius</i> var. <i>montanus</i> (Bernh.) Bässler, 1971	
<i>Lathyrus nissolia</i> L., 1753	
<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	

Taxon	Commentaire
<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw., 1788	
<i>Lemna minor</i> L., 1753	
<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br., 1812	
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	
<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	
<i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768	
<i>Lolium perenne</i> L., 1753	
<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	
<i>Lotus angustissimus</i> L., 1753	prairie longère
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793	
<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott, 1817	
<i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805	
<i>Luzula congesta</i> (Thuill.) Lej., 1811	
<i>Luzula multiflora</i> subsp. <i>multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811	
<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753	
<i>Lycopsis arvensis</i> L., 1753	
<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	
<i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753	
<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753	
<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb, 1967	
<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	
<i>Malus sylvestris</i> Mill., 1768	
<i>Malva moschata</i> L., 1753	
<i>Malva neglecta</i> Wallr., 1824	
<i>Matricaria discoidea</i> DC., 1838	
<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762	
<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	
<i>Melilotus albus</i> Medik., 1787	devant porte de grange
<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	
<i>Mentha pulegium</i> L., 1753	
<i>Mercurialis annua</i> L., 1753	talus domaine de landes
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811	
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	
<i>Montia arvensis</i> Wallr., 1840	landes ermite, domaine landes
<i>Myosotis discolor</i> subsp. <i>dubia</i> (Arrond.) Blaise, 1972	prairie longère. = <i>discolor</i> ssp <i>dubia</i>
<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel, 1814	
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809	
<i>Nymphaea alba</i> L., 1753	se développent depuis 5 ans dans l'anse du genévrier et de l'ancienne chaussée
<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir., 1798	
<i>Onopordum acanthium</i> L., 1753	
<i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762	1 individu proche longère
<i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753	
<i>Orobanche rapum-genistae</i> Thuill., 1799	une dizaine d'individus dans la partie sud de la lande de la Grande chaume
<i>Papaver dubium</i> L., 1753	secteur digue
<i>Papaver rhoeas</i> L., 1753	1 pied à côté maison rnn
<i>Persicaria amphibia</i> (L.) Gray, 1821	
<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach, 1841	
<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre, 1800	
<i>Peucedanum gallicum</i> Latourr., 1785	
<i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753	
<i>Phleum pratense</i> L., 1753	
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	
<i>Pilosella lactucella</i> (Wallr.) P.D.Sell & C.West, 1967	

Taxon	Commentaire
<i>Pilularia globulifera</i> L., 1753	grosse station développée sur les berges de la Grande chaume
<i>Plantago coronopus</i> L., 1753	
<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	
<i>Plantago major</i> L., 1753	
<i>Poa annua</i> L., 1753	
<i>Poa nemoralis</i> L., 1753	
<i>Poa trivialis</i> L., 1753	
<i>Polygala vulgaris</i> L., 1753	
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785	
<i>Populus nigra</i> L., 1753	
<i>Populus tremula</i> L., 1753	
<i>Potamogeton crispus</i> L., 1753	
<i>Potamogeton gramineus</i> L., 1753	
<i>Potamogeton natans</i> L., 1753	
<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788	
<i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schtdl., 1827	
<i>Potentilla argentea</i> L., 1753	digue et environs
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797	
<i>Potentilla neglecta</i> Baumg., 1816	P argentea n'est que dans les alpes.
<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	
<i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753	= Sanguisorba minor
<i>Primula elatior</i> (L.) Hill, 1765	
<i>Primula veris</i> L., 1753	
<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, 1801	
<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	
<i>Pulmonaria longifolia</i> (Bastard) Boreau, 1857	
<i>Pyrus communis</i> subsp. <i>pyraster</i> (L.) Ehrh., 1780	
<i>Quercus robur</i> L., 1753	
<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	
<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	
<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	
<i>Ranunculus lingua</i> L., 1753	anse buisson
<i>Ranunculus peltatus</i> Schrank, 1789	
<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	
<i>Ranunculus sardous</i> Crantz, 1763	
<i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753	
<i>Raphanus raphanistrum</i> L., 1753	
<i>Reseda luteola</i> L., 1753	
<i>Rhinanthus minor</i> L., 1756	
<i>Ribes alpinum</i> L., 1753	
<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	
<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser, 1821	
<i>Rosa canina</i> L., 1753	
<i>Rubus</i> L., 1753	
<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	
<i>Rumex acetosella</i> L., 1753	
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770	
<i>Rumex crispus</i> L., 1753	
<i>Rumex maritimus</i> L., 1753	anse buisson
<i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753	
<i>Salix alba</i> L., 1753	
<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	
<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	
<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort.,	

Taxon	Commentaire
1824	
<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla, 1888	
<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	
<i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753	
<i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753	
<i>Sedum acre</i> L., 1753	
<i>Sedum album</i> L., 1753	
<i>Sedum cepaea</i> L., 1753	chemin domaine de Landes
<i>Sedum rubens</i> L., 1753	
<i>Senecio vulgaris</i> L., 1753	
<i>Silene baccifera</i> (L.) Roth, 1788	
<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811	
<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982	
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., 1772	
<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	
<i>Solanum nigrum</i> L., 1753	
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769	
<i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753	
<i>Spergula rubra</i> (L.) D.Dietr., 1840	quelques individus bord d'étang ancien andain
<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839	
<i>Stellaria graminea</i> L., 1753	
<i>Stellaria holostea</i> L., 1753	
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789	
<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	
<i>Taraxacum</i> section <i>Ruderalia</i>	
<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br., 1812	parc grande chaume
<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	
<i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834	
<i>Trapa natans</i> L., 1753	un pied sur les berges restaurées du domaine de landes (ancien andain)
<i>Trifolium arvense</i> L., 1753	
<i>Trifolium aureum</i> Pollich, 1777	
<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804	
<i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794	
<i>Trifolium glomeratum</i> L., 1753	
<i>Trifolium hybridum</i> L., 1753	
<i>Trifolium incarnatum</i> L., 1753	
<i>Trifolium ornithopodioides</i> L., 1753	
<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	
<i>Trifolium repens</i> L., 1753	
<i>Trifolium striatum</i> L., 1753	
<i>Trifolium subterraneum</i> L., 1753	
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	
<i>Trocdaris verticillatum</i> (L.) Raf., 1840	
<i>Tussilago farfara</i> L., 1753	
<i>Typha angustifolia</i> L., 1753	
<i>Typha latifolia</i> L., 1753	
<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	
<i>Ulex minor</i> Roth, 1797	
<i>Urtica dioica</i> L., 1753	
<i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810	
<i>Valeriana dioica</i> L., 1753	
<i>Valeriana officinalis</i> subsp. <i>repens</i> (Host) O.Bolòs & Vigo, 1983	
<i>Valerianella locusta</i> f. <i>carinata</i> (Loisel.) Devesa, J.López & R.Gonzalo, 2005	
<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	

Taxon	Commentaire
<i>Veronica arvensis</i> L., 1753	
<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	
<i>Veronica hederifolia</i> L., 1753	
<i>Veronica officinalis</i> L., 1753	
<i>Veronica persica</i> Poir., 1808	
<i>Veronica scutellata</i> L., 1753	
<i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753	
<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	
<i>Vicia cracca</i> L., 1753	
<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821	
<i>Vicia sativa</i> L., 1753	
<i>Vicia sepium</i> L., 1753	
<i>Viola arvensis</i> Murray, 1770	talus berge domaine de landes
<i>Viola odorata</i> L., 1753	
<i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823	
<i>Viscum album</i> L., 1753	
<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel., 1805	

CHARACEES

Chara braunii C.C. Gmel.
Nitella translucens (Pers.) C.Agardh, 1824
Chara delicatula Ag.
Chara globularis Thuill., 1799

ARAIGNEES

Espèce	Nouveau	Commentaire
<i>Agalenatea redii</i> (Scopoli, 1763)	+	
<i>Agelena labyrinthica</i> (Clerck, 1758)	+	
<i>Agroeca brunnea</i> (Blackwall, 1833)		
<i>Agyneta mollis</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)		
<i>Agyneta rurestris</i> (C. L. Koch, 1836)		
<i>Allagelena gracilens</i> (C.L. Koch, 1841)	+	
<i>Alopecosa pulverulenta</i> (Clerck, 1758)		
<i>Anelosimus pulchellus</i> (Walckenaer, 1802)		
<i>Anelosimus vittatus</i> (C.L. Koch, 1836)		
<i>Antistea elegans</i> (Blackwall, 1841)		
<i>Anyphaena accentuata</i> (Walckenaer, 1802)		
<i>Araneus alsine</i> Walckenaer, 1802		
<i>Araneus angulatus</i> Clerck, 1758	+	
<i>Araneus diadematus</i> Clerck, 1758		
<i>Araneus quadratus</i> Clerck, 1758		
<i>Araniella cucurbitina</i> (Clerck, 1758)		
<i>Araniella opisthographa</i> (Kulczynski, 1905)		
<i>Arctosa cinerea</i> (Fabricius, 1777)		
<i>Arctosa leopardus</i> (Sundevall, 1833)		
<i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli, 1772)		
<i>Asagena phalerata</i> (Panzer, 1801)		
<i>Aulonia albimana</i> (Walckenaer, 1805)	+	
<i>Bathypantes gracilis</i> (Blackwall, 1841)		
<i>Centromerus serratus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1875)		
<i>Cercidia prominens</i> (Westring, 1851)		
<i>Cetonana laticeps</i> (Canestrini, 1868)		
<i>Cheiracanthium erraticum</i> (Walckenaer, 1802)		
<i>Cheiracanthium punctorium</i> (Villers, 1789)	+	
<i>Clubiona comta</i> C.L. Koch, 1839	+	
<i>Clubiona pallidula</i> (Clerck, 1758)		
<i>Clubiona phragmitis</i> C.L. Koch, 1843		
<i>Clubiona similis</i> L. Koch, 1867		
<i>Clubiona stagnatilis</i> Kulczynski in Chyzer & Kulczynski, 1897	+	
<i>Cnephalocotes obscurus</i> (Blackwall, 1834)		
<i>Coelotes atropos</i> (Walckenaer, 1830)		
<i>Crustulina guttata</i> (Wider, 1834)		
<i>Cyclosa conica</i> (Pallas, 1772)		
<i>Diaea dorsata</i> (Fabricius, 1777)		
<i>Dictyna arundinacea</i> Linnaeus, 1758		
<i>Dictyna uncinata</i> Thorell, 1856	+	
<i>Diplostyla concolor</i> (Wider, 1834)		
<i>Dolomedes fimbriatus</i> (Clerck, 1758)		
<i>Dolomedes plantarius</i> (Clerck, 1758)	+	Rare en France, sur liste rouge mondiale
<i>Ebrechtella tricuspida</i> (Fabricius, 1775)	+	
<i>Enoplognatha ovata</i> (Clerck, 1758)		
<i>Enoplognatha thoracica</i> (Hahn, 1833)		
<i>Episinus angulatus</i> (Blackwall, 1836)		
<i>Eratigena atrica</i> (C.L. Koch, 1843)	+	
<i>Erigone atra</i> Blackwall, 1833		
<i>Erigone dentipalpis</i> (Wider, 1834)	+	
<i>Euophrys herbigrada</i> (Simon, 1871)		
<i>Evarcha arcuata</i> (Clerck, 1758)		

<i>Floronia bucculenta</i> (Clerck, 1758)	+	
<i>Gibbaranea bituberculata</i> (Walckenaer, 1802)		
<i>Gnathonarium dentatum</i> (Wider, 1834)		
<i>Gongyliidiellum vivum</i> (O. Pickard-Cambridge, 1875)		
<i>Heliophanus cupreus</i> (Walckenaer, 1802)		
<i>Heliophanus flavipes</i> (Hahn, 1832)		
<i>Hylyphantes graminicola</i> (Sundevall, 1830)		
<i>Hypomma bituberculatum</i> (Wider, 1834)	+	
<i>Hypomma cornutum</i> (Blackwall, 1833)		
<i>Hypomma fulvum</i> (Bösenberg, 1902)	+	Rare
<i>Hypsosinga heri</i> (Hahn, 1831)	+	
<i>Hypsosinga pygmaea</i> (Sundevall, 1831)	+	
<i>Hypsosinga sanguinea</i> (C.L. Koch, 1844)		
<i>Kaestneria dorsalis</i> (Wider, 1834)		
<i>Labulla thoracica</i> (Wider, 1834)		
<i>Larinioides cornutus</i> (Clerck, 1758)		
<i>Larinioides patagiatus</i> (Clerck, 1758)	+	
<i>Leviellus thorelli</i> (Ausserer, 1871)	+	2ème mention française, colonie sur les murs de la grange du domaine de landes
<i>Linyphia hortensis</i> Sundevall, 1829		
<i>Linyphia triangularis</i> (Clerck, 1758)		
<i>Mangora acalypha</i> (Walckenaer, 1802)		
<i>Marpissa muscosa</i> (Clerck, 1758)	+	
<i>Marpissa nivoyi</i> (Lucas, 1846)		
<i>Marpissa radiata</i> (Grube, 1859)		
<i>Maso gallicus</i> Simon, 1894		
<i>Metellina mengei</i> (Blackwall, 1869)		
<i>Metellina merianae</i> (Scopoli, 1763)		
<i>Metellina segmentata</i> (Clerck, 1758)		
<i>Micaria albovittata</i> (Lucas, 1846)	+	
<i>Microlinyphia pusilla</i> (Sundevall, 1830)		
<i>Micrommata virescens</i> (Clerck, 1758)		
<i>Microneta viaria</i> (Blackwall, 1841)		
<i>Misumena vatia</i> (Clerck, 1758)		
<i>Myrmarachne formicaria</i> (De Geer, 1778)	+	
<i>Neoscona adianta</i> (Walckenaer, 1802)	+	
<i>Neriere clathrata</i> (Sundevall, 1830)	+	
<i>Neriere montana</i> (Clerck, 1758)	+	
<i>Nigma puella</i> (Simon, 1870)	+	
<i>Nigma walckenaeri</i> (Roewer, 1951)		
<i>Notioscopus sarcinatus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1872)		
<i>Nuctenea umbratica</i> (Clerck, 1758)	+	
<i>Oedothorax agrestis</i> (Blackwall, 1853)		
<i>Oedothorax fuscus</i> (Blackwall, 1834)		
<i>Oedothorax retusus</i> (Westring, 1851)		
<i>Oxyopes lineatus</i> Latreille, 1806	+	
<i>Oxyopes ramosus</i> (Martini & Goeze, 1778)	+	
<i>Ozyptila atomaria</i> (Panzer, 1801)		
<i>Ozyptila simplex</i> (O. Pickard-Cambridge, 1862)		
<i>Pachygnatha clercki</i> Sundevall, 1823		
<i>Pachygnatha degeeri</i> Sundevall, 1830		
<i>Paidiscura pallens</i> (Blackwall, 1834)		
<i>Pardosa agricola</i> (Thorell, 1856)		
<i>Pardosa bifasciata</i> (C.L. Koch, 1834)		
<i>Pardosa paludicola</i> (Clerck, 1758)		
<i>Pardosa prativaga</i> (L. Koch, 1870)		
<i>Pardosa proxima</i> (C.L. Koch, 1847)		

<i>Philodromus aureolus</i> (Clerck, 1758)		
<i>Philodromus cespitum</i> (Walckenaer, 1802)	+	
<i>Philodromus dispar</i> Walckenaer, 1826	+	
<i>Pholcomma gibbum</i> (Westring, 1851)		
<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuessly, 1775)	+	
<i>Phrurolithus minimus</i> C.L. Koch, 1839		
<i>Pirata piraticus</i> (Clerck, 1758)		
<i>Pirata tenuitarsis</i> Simon, 1876		
<i>Piratula hygrophila</i> (Thorell, 1872)		
<i>Piratula latitans</i> (Blackwall, 1841)		
<i>Pisaura mirabilis</i> (Clerck, 1758)		
<i>Pistius truncatus</i> (Pallas, 1772)	+	
<i>Pityohyphantes phrygianus</i> (C.L. Koch, 1836)	+	
<i>Porrhomma pygmaeum</i> (Blackwall, 1834)	+	
<i>Prinerigone vagans</i> (Audouin, 1826)		
<i>Pseudeuophrys erratica</i> (Walckenaer, 1826)		
<i>Pseudeuophrys lanigera</i> (Simon, 1871)	+	
<i>Saaristoa abnormis</i> (Blackwall, 1841)		
<i>Salticus zebraneus</i> (C.L. Koch, 1837)	+	
<i>Scytodes thoracica</i> (Latreille, 1802)	+	
<i>Segestria senoculata</i> (Linnaeus, 1758)	+	
<i>Singa hamata</i> (Clerck, 1758)		
<i>Sitticus caricis</i> (Westring, 1861)		
<i>Sitticus floricola</i> (C.L. Koch, 1837)		
<i>Steatoda bipunctata</i> (Linnaeus, 1758)	+	
<i>Steatoda triangulosa</i> (Walckenaer, 1802)	+	
<i>Synema globosum</i> (Fabricius, 1775)		
<i>Tallusia experta</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)		
<i>Tapinocyba mitis</i> (O. Pickard-Cambridge, 1882)		
<i>Tenuiphantes mengei</i> (Kulczynski, 1887)		
<i>Tenuiphantes tenuis</i> (Blackwall, 1852)		
<i>Tenuiphantes zimmermanni</i> (Bertkau, 1890)		
<i>Tetragnatha extensa</i> (Linnaeus, 1758)		
<i>Tetragnatha montana</i> Simon, 1874		
<i>Textrix denticulata</i> (Olivier, 1789)	+	
<i>Thanatus formicinus</i> (Clerck, 1758)	+	
<i>Theridion hemerobium</i> Simon, 1914	+	
<i>Theridion mystaceum</i> L. Koch, 1870	+	
<i>Theridion pictum</i> (Walckenaer, 1802)	+	
<i>Theridiosoma gemmosum</i> (L. Koch, 1878)		
<i>Tibellus oblongus</i> (Walckenaer, 1802)	+	
<i>Tiso vagans</i> (Blackwall, 1834)		
<i>Trochosa ruricola</i> (De Geer, 1778)		
<i>Trochosa terricola</i> Thorell, 1856		
<i>Walckenaeria vigilax</i> (Blackwall, 1853)		
<i>Xysticus acerbus</i> Thorell, 1872	+	
<i>Xysticus audax</i> (Schrank, 1803)	+	
<i>Xysticus erraticus</i> (Blackwall, 1834)		
<i>Xysticus kochi</i> Thorell, 1872		
<i>Zelotes erebeus</i> (Thorell, 1871)		
<i>Zelotes latreillei</i> (Simon, 1878)		
<i>Zelotes subterraneus</i> (C.L. Koch, 1833)		
<i>Zilla diodia</i> (Walckenaer, 1802)		
<i>Zora armillata</i> Simon, 1878		
<i>Zygiella x-notata</i> (Clerck, 1758)	+	

163 espèces

OPILIONS

Espèce
<i>Dicranopalpus ramosus</i> (Simon, 1909)
<i>Homalenotus quadridentatus</i> (Cuvier, 1795)
<i>Leiobunum rotundum</i> (Latreille, 1798)
<i>Nelima</i>
<i>Phalangium opilio</i> Linnaeus, 1761
<i>Platybunus bucephalus</i> (C.L.Koch, 1835)

CHILOPODES

Geophilus flavus (De Geer, 1778)
Lithobius forficatus (Linnaeus, 1758)
Strigamia acuminata (Leach, 1815)



PÔLE DÉVELOPPEMENT

14 av. Pierre Leroux - BP 17 - 23001 Guéret Cedex

Tél. 05 44 30 24 26

www.creuse.fr

RÉSERVE NATURELLE ETANG DES LANDES

23170 Lussat

Tél. 05 55 82 84 55

rn-etang-landes@cg23.fr